

موضوع پمفلت

آریتمی

کدفرم: M-p.ph/16NM

CCU _ 1404

در صورت خونریزی از بینی یا خون مردگی در بدن یا خون در مدفوع سریع به پزشک مراجعه کنید.

مصرف هم زمان وارفارین با داروهای زیر میتواند باعث تشدید اثر وارفارین و ایجاد خونریزی شوند :
آسپرین ، آنتی بیوتیک ، استامینوفن دیکلوفناک ناپروکسن

ممکن است برای شما داروی **دیگوکسین** برای تنظیم ضربان قلب و تقویت ماهیچه ای قلب تجویز شود که به صورت قرص ۰,۲۵ است. در صورت تجویز داروی آهن یا آنتی اسید آنها را با فاصله دو ساعت از دیگوکسین مصرف کنید.

مصرف دیگوکسین باید با دقت زیاد انجام شود. زیرا احتمال مسمومیت با این دارو وجود دارد.

علائم مسمومیت با دیگوکسین : تهوع استفراغ بی اشتها بی درد شکم اسهال دوبینی تاری دید و دید رنگی (زرد یا آبی دیدن اشیا) سردرد گیجی خواب آلودگی کند شدن ضربان قلب و ...

به یاد داشته باشید قبل از مصرف قرص نبض خود را کنترل کنید اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه بود دارو خورده نشود.

منبع یا منابع : www.cdc.gov

COMPREHENSIVE BOOK intensive
Nursing Care in CCU

با آرزوی سلامتی برای شما ، جهت کسب اطلاعات و پیگیری،

می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:

آدرس : لاهیجان ، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس : ۰۱۳۴۲۴۲۷۷۰۰

وبسایت بیمارستان : www.milad-hospital.com

دفیبریلاسیون چیست؟

دفیبریلاسیون راهی برای تبدیل ضربان قلبی غیرطبیعی به ضربان قلبی طبیعی از طریق یک شوک الکتریکی کوچک می باشد.

ممکن است این دفیبریلاتور قلبی کاشتنی (ICD) زیر پوست ناحیه فوقانی قفسه سینه کاشته شود تا شوک هایی را ایجاد نماید و به عنوان ضربان ساز عمل کند زمانی که ضربان قلب غیر طبیعی می شود ، این دستگاه آن را شناسایی میکند این دستگاه به شکل ۲۴ ساعته عمل می کند.

ابلیشن یا سوزاندن بافت قلبی چیست ؟

این روش یک راه اصلاح آریتمی و برگشت قلب به ریتم طبیعی می باشد.

این روش از طریق تعبیه یک لوله نازک (کاتتر) در سیاهرگ شما و هدایت آن به عضله قلب صورت می گیرد. نوک کاتتر میزان زیادی انرژی را آزاد می کند و نواحی بسیار کوچکی از بافت قلبی را که سبب ایجاد پیام های الکتریکی غیرطبیعی می شوند را تخریب می نماید.

دارو درمانی

ممکن است برای شما داروی ضد انعقاد و رقیق کننده خون مانند **وارفارین سدیم** (Warfarin) تجویز شود. دوز دارو ۵-۱ میلی گرم است. دوز مناسب دارو با آزمایش PT طبق تجویز پزشک تعیین میگردد.

آریتمی به چه مفهوم است؟

آریتمی یا به عبارت دیگر دیس ریتمی (اختلال در ریتم طبیعی قلب) عبارت است از ریتم غیرطبیعی قلب. این حالت ممکن است آنقدر کوتاه باشد که تعداد ضربان کلی قلب را تحت تاثیر قرار ندهد یا برعکس ممکن است سبب شود که ضربان قلب خیلی کند یا خیلی تند شود. آریتمی ممکن است هیچ علامتی نداشته باشد یا سبب علائمی مانند سبکی سر یا سرگیجه شود.

ریتم منظم قلبی



ریتم نامنظم قلبی




علائم آریتمی چه هستند؟

- ❖ ممکن است احساس لرزش (ارتعاش) در قفسه سینه یا گردن ایجاد شود.
- ❖ اگر آریتمی شدید باشد یا آنقدر طولانی شود که عملکرد قلب را تحت تاثیر قرار دهد ممکن است قلب قادر به پمپ کردن کافی خون به بدن نباشد و این امر سبب احساس خستگی یا سبکی سر یا بی حالی شود. همچنین ممکن است منجر به مرگ شود.

آریتمی ها چگونه درمان میشود؟

قبل از شروع درمان پزشک باید بداند آن آریتمی در قلب از کجا آغاز می شود؟
یک نوار قلب یا الکتروگرام به تشخیص آریتمی ها کمک میکند. نوار قلب در واقع ثبت پیام های الکتریکی ایجاد شده توسط قلب بر روی کاغذ است.



سایر راه های بررسی استفاده از دستگاه ثبت قابل حمل (هولتر مانیتورینگ)، تستهای استرس ورزشی و ... می باشد.



راه های درمان آریتمی عبارتند از :

- ❖ تغییر شیوه زندگی
- ❖ داروهای ضد انعقاد جهت کاهش میزان خطر لخته شدن خون و سکتة مغزی
- ❖ داروهای پیشگیری و کنترل آریتمی و درمان شرایط مربوط به آن مانند پرفشاری خون، بیماری کرونری قلبی و نارسایی قلبی
- ❖ یک ضربان ساز که از یک باتری جهت کمک به تنظیم ضربان قلب شما استفاده میکند.
- ❖ دفیبریلاسیون قلبی و دفیبریلاتورهای قلبی کاشتنی (ICD)
- ❖ جراحی
- ❖ ابلیشن یا سوزاندن بافت قلبی

