

استفراغ در نوزادان



کدفرم: M-p.ph/36NM

NICU _ 1404

*** واحد گرافیک بیمارستان میلااد ***



منبع: ACORN

با آرزوی سلامتی برای شما، جهت کسب اطلاعات و پیگیری،
می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:

آدرس: لاهیجان، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس: ۰۱۳-۴۲۴۴۵۲۵۲

وبسایت بیمارستان: www.milad-hospital.com

اینستاگرام: MiladHospital.Lahijan

در استفراغ نوزادان چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم:

کم ابی یا استفراغ مکرر

تب شدید

ادرار تیره یا عدم ادرار

شکم متورم یا شکم دردناک در لمس

اسهال به رنگ زرد مایل به سبز یا ابی

استفراغ پرتابی ممکن است نشانه تنگی پیلور باشد

استفراغی که بیش از یک روز طول بکشد یا استفراغ

مکرر

استفراغ خونی



استفراغ در نوزادان:

علت استفراغ در نوزادان می تواند از سوء هاضمه و گریه طولانی مدت تا ناهنجاری های دستگاه گوارش متغیر باشد. اگرچه استفراغ کوتاه مدت در نوزادان نگران کننده نیست، اما استفراغ مکرر نیاز به تشخیص علت اصلی و درمان دارد. همچنین والدین باید در هنگام بروز استفراغ در نوزادان برای پیشگیری از خطر کم آبی بدن، به دنبال درمان باشند. در مورد دلایل، درمان، درمان های خانگی استفراغ در نوزادان و زمان مراجعه به مراقبت های پزشکی بیشتر بدانید.

شایع ترین علت استفراغ نوزادان

۱. ریفلاکس: مری در نوزادان هنوز کامل نشده است بنابراین ممکن است شیر پس اغز تغذیه در مری برگردد در این وضعیت احتمال دارد شیر از دهان یا بینی نوزاد خارج شود. ریفلاکس معمولاً در طی ۱۸ ماهگی با رشد کودک از بین میرود.

۲. انفولانزای معده: انفولانزای معده که گاستروانتریت ویروسی نیز نامیده میشود عفونت ویروسی معده است. علاوه بر استفراغ اسهال و تب و درد شکم از علائم بروز گاستروانتریت است.

۳. الرژی غذایی:

الرژی یا عدم تحمل غذا ممکن است باعث استفراغ در نوزادان شود. از طرفی هم نوع رژیم غذایی مادر میتواند یکی از دلایل حساسیت در نوزاد شیرخوار باشد. شیر- تخم مرغ- اجیل- ماهی از جمله مواد حساسیت زای رایجی هستند که وقتی مادر از آن تغذیه میکند ممکن است باعث بروز الرژی در نوزاد شود.

۴. مسمومیت غذایی:

مسمومیت در نوزادانی که از شیشه شیر میخورند یا از شیر گرفته شده اند ممکن است رخ دهد. بطری های غیر استریل، غذاهای فاسد و غذا و آب الوده میتوانند مسمومیت ایجاد کنند و منجر به استفراغ شوند.



۵. پر خوری:

نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند یا بطری تغذیه میشوند در صورت پر خوری ممکن است استفراغ کنند.

۶. تنگی مادرزادی پیلور:

تنگی مادرزادی پیلور باریک شدن پیلوروس از بدو تولد است. این بیماری از ورود غذا به روده جلوگیری میکند و باعث استفراغ شدید میشود. در تنگی مادرزادی پیلور نوزاد گرسنه است اما اندکی پس از غذا خوردن ممکن است ۶. انوازیناسیون یا در هم رفتگی روده: در هم رفتگی روده شرایطی است که بخشی از روده به قسمت دیگر تا میخورد

