

تاکي پنه گذاري



کدفرم : M-p.ph/38NM

NICU _ 1404

اثر NCPP

- بهبود اکسیژن رسانی- بهبود بخشیدن به عملکرد ریه- جلوگیری از کلاپس الویول ها- کاهش آپنه

علائم موفق CPAP

- کاهش تعداد تنفس
- بهبود در سطح گازهای خونی
- برطرف شدن سیانوز
- منظم واز بین رفتن دیسترس تنفسی

منبع: نلسون

با آرزوی سلامتی برای شما ، جهت کسب اطلاعات و پیگیری، می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:

آدرس : لاهیجان ، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس : ۰۱۳-۴۲۴۴۵۲۵۲

وبسایت بیمارستان : www.milad-hospital.com

اینستاگرام : MiladHospital.Lahijan

درمان

- دیسترس خفیف تنفسی به علت TTN نوزادان اغلب طی ۴ ساعت اول پس از تولد وقتی که باقی مانده مایع ریه باز جذب می شود بهبود می یابد.

- اگر دیسترس تنفسی بیش از ۴ ساعت ادامه یابد نوزاد به ارزیابی بیشتر ورادیو گرافی قفسه سینه برای تایید تشخیص و راهنمایی برای مداخله های مراقبتی بیشتر نیاز دارد.

- ومانیتورینگ گازهای شریانی یا پالس اکسی متری می باشد.

- در صورتی که دیسترس تنفسی بدتر شد بسته به شرایط نوزاد تصمیم گیری میشود.

- بهبود معمولاً ظرف ۲-۳ روز صورت می گیرد و درمان حمایتی است که شامل دادن اکسیژن با مکانیزم

عوامل خطر کدامند؟



-آسم و دیابت مادری

-این اختلال میتواند در نوزادان نارس دچار سندرم دیسترس تنفسی و در نوزادان بالغ که مایع آمنیوتیک موکونیومی داشته اند رخ دهد.

بیماری های تنفسی نوزادان مخصوصا سندرم زجر تنفسی در جنس پسر و در متولدین سزارین انتخابی بیش از متولدین سزارین اورژانسی و زایمان طبیعی بوده است.

چه نوزادانی مبتلا میشوند؟



-نوزادان نارس

-نوزادان بالغی که به طریق سزارین متولد شده

-نوزادانی که با دپرسیون تنفسی متولد شده اند

-همه ی نوزادانی که در پاکسازی مایع از ریه دچار مشکل بوده اند

-نوزادان مادر دیابتی و اسماتیک



تاکی پنه گذرای نوزادی (TTN)



تاکی پنه گذرای نوزادی به معنای دیسترس تنفسی ناشی از تاخیر در باز جذب مایع باقی مانده از زمان جنینی در ریه می باشد.

این اختلال ممکن است با شروع زود هنگام تاکی پنه همراه باشد که گاهی با تو کشیدگی قفسه سینه یا ناله در هنگام بازدم و گهگاه سیانوزی که با مقدار کم اکسیژن بر طرف می شود مشخص می گردد.

