

رنال کولیک (سنگ ادراری)

گروه هدف : بیماران

بخش اورژانس ۱۴۰۴

کد فرم: M-P.PH/97NM



منابع : برونر سودارث ۲۰۲۰

با آرزوی سلامتی برای شما ، جهت کسب اطلاعات و پیگیری،

می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:

آدرس : لاهیجان ، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس : ۰۱۳۴۲۴۲۷۷۰۰

وبسایت بیمارستان : www.milad-hospital.com

علائم هشدار و زمان مراجعه به پزشک:

- * تشدید درد به طوری که به درمان دارویی پاسخ ندهد و حمله ی درد شدید بیش از یک ساعت با وجود مصرف مسکن طول بکشد .
- * تهوع/ استفراغ شدید به طوری که قادر به خوردن و آشامیدن نبوده و باعث کم آبی بدن شود .
- * تشدید یا تداوم وجود خون واضح در ادرار
- * تب و لرز
- * درد و سوزش و ناراحتی شدید هنگام دفع ادرار
- * تغییر رنگ/ تیره شدن/ کدر شدن رنگ ادرار
- * در صورتی که درد و تهوع شما به درمان سرپایی پاسخ دهد، دچار اختلال کلیه مانند عفونت یا مشکل در عملکرد کلیه نبوده و به بیماری مزمن دیگری مبتلا نباشید، با رعایت موارد بالا می توانید حتی تا ۲ هفته در منزل منتظر دفع سنگ باشید .
- * در طی روزهای آینده به متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست) مراجعه کنید. به خصوص اگر برای اولین بار است که دچار سنگ کلیه می شوید حتما باید آزمایش های تکمیلی خون و ادرار انجام شود تا اگر علت مشخص یا بیماری خاصی وجود دارد که باعث تشکیل سنگ شده مشخص شود و اگر می توان از بروز دوباره ی سنگ جلوگیری کرد، روش های پیش گیری به شما آموزش داده شود.

مراقبت در منزل و نکات پرستاری :

* اگر در اورژانس برای شما سونوگرافی انجام شده است، برگه ی جواب آن را دور نیندازید و حتما در مراجعات بعدی به اورژانس یا پزشک، تا زمان دفع سنگ، آن را همراه داشته باشید .

* مایعات زیاد مصرف کنید روزانه حداقل ۲/۵ تا ۳ لیتر مایعات بنوشید که بیش از نصف آن فقط آب ساده باشد. میزان مصرف مایعات باید به اندازه ای باشد که حداقل ۲ لیتر ادرار در هر شبانه روز دفع کنید (در طول شب حداقل یک یا دو بار برای ادرار کردن بیدار شوید) و رنگ ادرار زرد روشن یا بی رنگ باشد .



* از مصرف نمک و شکر زیاد خودداری کنید .

* هیچ ماده ی غذایی را بدون دستور پزشک از رژیم غذایی خود کاملاً حذف نکنید، بدن به همه ی انواع مواد غذایی نیاز دارد .

* از استراحت مطلق خودداری کرده و فعالیت جسمی و ورزش روزانه ی مناسب داشته باشید، این کار به دفع سریع تر سنگ کمک می کند

* بهتر است سنگ را پس از دفع برای بررسی و تعیین نوع و جنس آن به پزشک یا آزمایشگاه بدهید (به خصوص اگر برای اولین بار است که دچار سنگ کلیه می شوید). برای این کار لازم است پس از ترخیص تا زمان دفع سنگ، هر بار که به دستشویی می روید ادرار خود را ابتدا در یک ظرف جمع آوری کنید یا هنگام ادرار کردن از یک صافی ریز استفاده کنید تا در صورت دفع سنگ، وارد فاضلاب نشود و بتوانید آن را نگه دارید .

* دفع نهایی سنگ همراه ادرار و خروج آن از پیشابراه به خارج بدن معمولاً بدون درد است و گاهی ممکن است درد خفیف و ناراحتی مختصر کوتاه مدت همراه دفع ایجاد شود که سریع برطرف می شود نگران نباشید .

داروها در منزل:

* بهتر است از داروهای ضد درد خوراکی غیر مخدر مثل قرص دیکلوفناک، ناپروکسن یا استامینوفن استفاده کنید .

* در صورت تشدید درد، از شیاف دیکلوفناک

استفاده کنید (حداکثر ۳ عدد روزانه)

* در صورتی که هنگام ترخیص برای شما داروهای

شل کننده و گشاد کننده ی حالب مثل

تامسولوسین (مدالوسین) تجویز شده است طبق

دستور مصرف کنید .

* توجه کنید که مصرف زیاد دیکلوفناک / بروفن /

ناپروکسن باعث ناراحتی و سوزش معده می شود و

چنان چه سابقه ی ابتلا به زخم معده دارید از

مصرف آنها پرهیز کنید. همچنین ممکن است باعث

تشدید آسم و فشار خون شوند.

