


سندرم دیسترس تنفسی



درمان:

نوزاد به بخش مراقبتهای ویژه منتقل میشود. اگر علائم خفیف باشد فقط به اکسیژن بیشتری نیاز دارد معلا از راه لوله تنفسی بینی انجام میشود. اگر نیاز به اکسیژن بیشتر بود از راه کلاهک هود یا کانولای بینی یا لوله های تنفسی وصل به ونتیلاتور نوزاد را حمایت میتوان کرد که در نهایت با کمک جایگزینی سورفکتانت مصنوعی به نوزاد کمک میشود.



منبع : Acron

با آرزوی سلامتی برای شما ، جهت کسب اطلاعات و پیگیری، می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:


آدرس : لاهیجان ، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس : ۰۱۳-۴۲۴۴۵۲۵۲

وبسایت بیمارستان : www.milad-hospital.com

اینستاگرام : MiladHospital.Lahijan

تشخیص:



متخصص نوزاد سندرم زجر تنفسی را معمولا با بهره گیری از ترکیبی از روش های زیر تشخیص میدهد: ظاهر رنگ وتلاش نوزاد برای تنفس که نشان دهنده نیاز به اکسیژن است رادیوگرافی قفسه سینه گازهای خون خون شریانی الکتروکاردیو گرافی



کدفرم : M-p.ph/37NM

NICU _ 1404

سندرم دیسترس تنفسی (RDS):

سندرم دیسترس تنفسی در نوزادانی بروز میابد که ریه هایشان هنوز بطور کامل رشد نکرده است. سندرم زجر تنفسی در اصل پی آمدهم وجود ماده ی لغزنده ای به نام سورفکتانت در ریه است. این ماده به ریه ها کمک می کند تا پر از هوا شوند و کیسه های هوا را در حالت باد شده نگه می دارد. سورفکتانت زمانی در ریه ها وجود دارد که رشد آنها کامل شده باشد. سندرم زجر تنفسی نوزادان گاهی از مشکلات ژنتیکی تاثیر گذار بر رشد ریه نشأت میگیرد.



علامه:



علامه در اکثر موارد چند دقیقه پس از تولد بروز می کند. بالین حال علامه گاهی تا چند ساعت مشاهده نمی شوند. علامه سندرم دیسترس تنفسی عبارتند از:

سیانوز-آپنه نوزادی

کاهش خروج ادرار-خرخر وناله کردن نوزاد
پهن شدن بینی نوزاد که نشان دهنده ی تلاش نوزاد برای نفس کشیدن است
تنفس سریع-تنفس کم عمق-حرکتهای غیر عادی تنفسی مانند به عقب کشیدن عضله های سینه حین تنفس

عوامل خطر:

اکثر موارد دیسترس تنفسی در نوزادانی دیده میشود که بیش از هفته ۳۷ متولد می شوند. هرچه رشد ریه ها ناقص تر باشد احتمال بروز RDS پس از تولد بالاتر خواهد بود. دیگر عامل های خطر افزایش دهنده ی دیسترس تنفسی عبارتند از:
-سابقه ی ابتلا خواهر یا برادر به دیسترس تنفسی-
دیابت بارداری مادر-سزارین یا القای زایمان قبل از کامل شدن دوره ی بارداری-مشکلات بارداری که جریان خون را در بدن نوزاد کاهش می دهد-
بارداری چند قلویی-زایمان سریع

