

کولونوسکوپي



۲ - پارگی یا سوراخ شدن کولون که عارضه ای جدی، ولی غیر رایج است و در کمتر از یک در هزار رخ می دهد. در صورت به وجود آمدن این عارضه به طور معمول نیاز به جراحی اورژانسی می باشد. که البته این عارضه به طور کامل با جراحی درمان می شود.

۳ - عوارض جانبی داروهای مورد استفاده به عنوان ضد درد یا خواب آور مانند حساسیت به دارو یا اثرات ناخواسته که گاه نیاز به تجویز داروهای دیگری برای کنترل و درمان آنها وجود دارد.

۴ - باز کردن مجرای روده بزرگ حین کولونوسکوپي، نیاز به داخل کردن هوا به وسیله کولونوسکوپ دارد و ممکن است بیمار احساس نفخ یا درد شکمی داشته باشد که ناشی از اتساع کولون است. بیمار می تواند بدون ناراحتی، این گاز را طی کولونوسکوپي و یا بعد از آن از راه مقعد دفع کند.

۵ - در صورت پیدایش علائمی مانند:

الف) درد شدید شکمی ب) اتساع و سفتی شکم
پ) استفراغ ت) تب ث) خونریزی بیشتر از چند قاشق باید هر چه سریعتر به پزشک مسئول اطلاع داده شود.
۶ - در صورت داشتن بیماری زمینه ای قبلی مانند (بیماریهای قلبی و عروقی، تنفسی، بیماری دیابت و...) به اطلاع متخصص محترم گوارش و نیز متخصص بیهوشی مربوطه رسیده شود. مدارک مربوط به بیماری نیز همراه شما باشد.

با آرزوی سلامتی برای شما، جهت کسب اطلاعات و پیگیری،

می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:

آدرس: لاهیجان، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس: ۰۱۳-۴۲۴۴۵۲۵۲

وبسایت بیمارستان: www.milad-hospital.com

اینستگرام: MiladHospital.Lahijan



ممکن است اکسیژن رسانی در طی کولونوسکوپي برای بعضی بیماران سالمند یا دچار بیماری قلبی و ریوی زمینه ای، ضروری باشد. بیمار به پهلوی چپ می خوابد و ممکن است در حین کولونوسکوپي نیاز به تغییر وضعیت داشته باشد. انجام عمل کولونوسکوپي پس از تجویز داروها و ضد درد شروع می شود که بیماران در طی معاینه در خواب عمیق هستند و درد ندارند. ممکن است حین کولونوسکوپي به انجام بیوپسی (نمونه برداری کوچک بافتی) یا خارج کردن پولپ (رشد بافت به داخل فضای روده) نیاز باشد که انجام آن بی درد است. گرچه بیماران درباره درد و ناراحتی انجام کولونوسکوپي نگرانند، ولی این کار به راحتی و بدون درد انجام می گردد. بیمار باید ضرورت انجام آن را بپذیرد و درک کند. پزشک معالج بهترین کسی است که می تواند اطلاعات کافی را در اختیار بیمار قرار دهد.

عوارض کولونوسکوپي

به طور کلی کولونوسکوپي بی خطر است و عوارض آن غیر معمول می باشد. البته امکان بروز این عوارض وجود دارد:
۱ - خونریزی از محل بیوپسی یا خارج کردن پولپ که معمولاً جزئی است و در بیشتر مواقع نیاز به مداخله درمانی ندارد.



آمادگی برای انجام کولونوسکوپی

روز اول:

- رژیم غذایی مایعات فراوان مصرف شود. (آب میوه - آب - چای - سوپ کاملاً صاف شده فراوان)
- ضمناً شیر مصرف نشود.

روز دوم:

- رژیم مایعات روز اول رعایت گردد.
- ۴ پودر سولفات منیزیم یا پودر پیدرولاکس هر بسته در یک لیتر آب یا آب میوه حل شده از ساعت ۸ صبح هر یک ساعت یک لیوان از آن میل گردد.
- ۱۶ عدد قرص بیزاکودیل همزمان با مصرف پودرها در ساعت ۸ صبح هر یک ساعت ۲ عدد قرص بیزاکودیل میل شود.

روز سوم:

- که روز انجام کولونوسکوپی است ۸ ساعت قبل از انجام کولونوسکوپی ۴ عدد قرص بیزاکودیل بعلاوه یک بطری آب معدنی کوچک مصرف شود.

توجه داشته باشید:

- ۱ - از مصرف غذاهای جامد و مایعات رنگی پرهیز نمایید. زیرا مایعات رنگی مخصوصاً قرمز رنگ می تواند ترشحات روده را قرمز نموده و در تشخیص بیماری مشکل ساز باشد.
- ۲ - مصرف قرص آهن و داروهای حاوی آهن را قطع کنید زیرا آهن می تواند رنگ پوشش روده را تغییر دهد.
- ۳ - اگر دچار بیماری قلبی - اختلال انعقادی خون و هر گونه بیماری زمینه ای دیگر هستید قبل از انجام کولونوسکوپی پزشک معالج خود را مطلع سازید.

نکات ویژه:

- ۱ - چنانچه دارویی به صورت مرتب مصرف می شود، تغییر مقدار دارو یا قطع داروهایی مانند آسپرین یا وارفارین که ممکن است خطر خونریزی را زیاد کنند باید با نظر پزشک معالج انجام شود. مصرف داروهایی مانند داروهای ضد فشار خون، ضد دیابت یا ضد تشنج نیز باید با توجه به حساسیت بیماری ادامه یابد و حتماً به اطلاع پزشک معالج برسد.
- ۲ - حضور همراهی برای بیمار ضروری است تا برای انتقال به منزل دچار مشکل نشود. گرچه بیمار در زمان ترخیص بیدار است، ولی اندکی گیج بوده و فرد قادر به رانندگی نیست.
- ۳ - بیمار پس از کولونوسکوپی، تا زمانی که اثر داروها از بین برود تحت نظر باقی می ماند. البته بهتر است در آن روز استراحت کند و به کاری مشغول نشود. (از جمله رانندگی).
- ۴ بیمار می تواند پس از بازبایی هوشیاری خود، غذای معمولی خود را میل کند.

روش انجام کولونوسکوپی

کولونوسکوپ، لوله ای انعطاف پذیر با قطری در حدود انگشت اشاره (11mm) و مجهز به عدسی و منبع نور است و بدین وسیله پزشک می تواند تصویر را بر روی صفحه نمایشگری که در مقابل وی است مشاهده نماید. پیش از کولونوسکوپی، جهت تزریق داروها توسط پرستار برای بیمار سرم وصل می شود که درد آن مشابه درد خونگیری یا یک تزریق معمولی می باشد. کنترل علائم حیاتی شامل فشار خون، ضربان قلب و تنفس هم انجام می گیرد که فاقد درد است.

کولونوسکوپی چیست؟

دیدن داخل روده بزرگ به وسیله دستگاه کولونوسکوپ از راه مقعد می باشد. که تا انتهای روده بزرگ و اغلب بخش انتهایی روده کوچک مورد بررسی و معاینه قرار می گیرد. این عمل به طور معمول به ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت زمان لازم دارد.

علل انجام:

کولونوسکوپی، یک روش تشخیصی بسیار ایمن و کم خطر است که اطلاعاتی در باره روده بزرگ (کولون) فراهم می کند که سایر روش های تشخیصی قادر به ارائه آن نیستند. این کار توسط فوق تخصص بیماریهای گوارش انجام می شود.

آمادگی های لازم جهت بیماران قبل از انجام کولونوسکوپی (آندوسکوپی تحناتی):

برای به دست آوردن نتیجه مطلوب از انجام کولونوسکوپی، کولون (روده بزرگ) بیمار باید کاملاً آماده باشد تا دید کافی جهت بررسی پوشش داخلی روده بزرگ وجود داشته باشد.

