

مسمومیت بارداری یا پره اکلامپسی



گروه هدف: بیماران
۱۴۰۴/ بخش مادر

کد فرم: M-P.PH/99NM



منابع: راهنمای کشوری اداره خدمات مامایی

با آرزوی سلامتی برای شما، جهت کسب اطلاعات و پیگیری،
می توانید از راههای زیر اقدام فرمایید:

آدرس: لاهیجان، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود

شماره تماس: ۰۱۳-۴۲۴۴۵۲۵۲

وبسایت بیمارستان: www.milad-hospital.com

اینستاگرام: MiladHospital.Lahijan

عوارض مادری پره اکلامپسی

1. نارسایی کلیوی و کبدی و ریوی
2. سکته مغزی
3. تشنج
4. اختلالات انعقادی و کاهش پلاکت خون

عوارض جنین پره اکلامپسی

- جدا شدن زود هنگام جفت
- تاخیر رشد داخل رحمی جنین
- زایمان زودرس
- مرگ داخل رحمی جنین



نکته قابل توجه این است که درمان قطعی و اصلی مسمومیت بارداری، ختم حاملگی است.

عوامل زمینه ساز بروز پره اکلامپسی



در صورتی که پره اکلامپسی به موقع تشخیص داده شود و مادر تحت مراقبت کامل قرار گیرد، معمولاً عارضه‌ی خاصی به همراه ندارد. ولی اگر به موقع تشخیص داده نشود و مادر تحت مراقبت قرار نگیرد، عوارض جدی در پی خواهد داشت. این عوارض به دو دسته عوارض مادری و جنینی تقسیم می‌شوند.



مسمومیت بارداری یا پره اکلامپسی چیست:

به افزایش فشار خون بیشتر یا مساوی با ۱۴۰/۹۰ بعد از هفته ۲۰ بارداری که همراه با دفع پروتئین از طریق ادرار باشد و حداکثر ۱۲ هفته بعد از بارداری به حد طبیعی برگردد پره اکلامپسی گفته می‌شود که اگر تشنج نیز به آن اضافه گردد به آن اکلامپسی می‌گویند.

عوامل تشدید کننده پره اکلامپسی:

- تغذیه نامناسب
- دیابت
- سابقه فشارخون بالا یا مسمومیت بارداری در حاملگی قبلی
- بیماری کلیوی مزمن
- حاملگی اول
- استعمال سیگار
- مصرف الکل
- چاقی
- سابقه‌ی پره اکلامپسی در فامیل درجه اول
- سن زیر ۱۸ سال و بیشتر از ۳۵ سال